

Cómo funciona el Servicio Antituberculoso Industrial de Vergara (25) 14-IX-33

Vergara (Continuación). — Actividad diagnóstica: «La primera y fundamental función del Dispensario fué aquella de establecer, con auxilio de la radiología, pruebas de laboratorio, biológicas y clínicas, las condiciones del paciente que se presenta a reconocimiento. Esta actividad de diagnóstico tiene gran importancia y constituye un verdadero puntal de la labor dispensarial.

Las investigaciones de diagnóstico efectuadas son las siguientes:

Radioscopías, 8.663. Radiografías, 118. Examen de expectoración, 412. Velocidad de sedimentación, 619. Reacciones tuberculinicas, 398. Otros análisis, 103.

Los enfermos fueron reagrupados, según los resultados diagnósticos, bajo la siguiente clasificación:

Primero: Enfermos de tuberculosis pulmonar y laringea clínica y radiológicamente confirmados, con bacilo positivo en expectoración.

Segundo: Enfermos de tuberculosis pulmonar clínica y radiológicamente confirmados con bacilo negativo en el momento del examen, pero que por su forma clínica-radiológica, evolución, ecétera, hacen prever una posible positividad ulterior.

Tercero: Enfermos portadores de tuberculosis mínimas, pero en evolución.

Cuarto: Portadores de restos cicatriciales inactivos.

Quinto: Pleuritis exudativas.

Sexto: Adenopatía biliar activa y evolutiva.

Séptimo: Procesos no tuberculosos.

El resultado obtenido en la investigación diagnóstica es el siguiente:

Grupo primero, 46. Grupo segundo, 26. Grupo tercero, 74. Grupo cuarto, 255. Grupo quinto, 24. Grupo sexto, 40. Grupo séptimo, 755.

Actividad profiláctica: Como profilaxis colectiva realizada por este Dispensario hemos practicado la investigación especialmente al ambiente escolar, obreros de las industrias y familiares y a las pequeñas colectividades del comercio, funcionarios, etc.

Asimismo, como medida profiláctica sistemática, fueron vistos radiológicamente todos los convivientes en ambiente contagioso y, en general, todos los amenazados, sean niños o adultos, pues no basta reconocer una sola vez a una persona que ha estado expuesta al contagio tuberculoso, ya que la enfermedad puede manifestarse sólo después de un cierto periodo de silencio o latencia. En otro aspecto de la profilaxis fué siempre aconsejada la vacunación B. C. G. en los alérgicos.» (Continuará.)

CINE. — Cinema Vergara, mañana, sábado, «La egoísta», con Bette Davis. — C.